


◎サロマ湖付着生物ラーバ出現状況

9月26日に付着生物のラーバ調査を行った結果、イガイ（シュウリガイ）ラーバは平均で52個/トン出現していました。付着サイズのラーバは見られませんでした。

ホヤ類（エボヤ、ユウレイボヤ、ザラボヤ）のラーバは地点によりばらつきがありましたが平均で123個/トン出現しており、先週よりも増加していました。

次回は10月2日（月）に実施予定です。


付着物ラーバ関連調査地点図



イガイラーバの出現状況

	St. 1	St. 4	St. 5	St. 8	平均
140 ~ 150	0.0	11.3	7.5	2.8	5.4
150 ~ 160	0.0	5.7	0.0	0.0	1.4
160 ~ 170	0.0	11.3	15.1	0.0	6.6
170 ~ 180	0.0	11.3	30.2	5.7	11.8
180 ~ 190	0.0	11.3	22.6	5.7	9.9
190 ~ 200	34.8	5.7	7.5	8.5	14.1
200 ~ 210	0.0	0.0	0.0	5.7	1.4
210 ~ 220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220 ~ 230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230 ~ 240	0.0	5.7	0.0	0.0	1.4
240 ~ 250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
250 ~ 260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
260 ~ 270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
270 ~ 280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
280 ~ 290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
290 ~ 300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	34.8	62.2	83.0	28.3	52.1
200 μ m以上	0.0	5.7	0.0	5.7	2.8
	0.0%	9.1%	0.0%	20.0%	5.4%
260 μ m以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ホヤ類	19.6	19.8	337.8	113.2	122.6

付着サイズのイガイラーバ出現状況



ホヤ類の出現状況

