


◎サロマ湖付着生物ラーバ出現状況

9月24日に湖内4地点で付着生物のラーバ調査を行った結果、イガイ（シュウリガイ）ラーバは平均で81個/ト出现しており、前回よりも減少していました。

ホヤ類（ザラボヤ、ユウレイボヤ、エボヤ）のラーバは地点によりばらつきがありました。平均でザラボヤが26個/ト、ユウレイボヤが27個/ト、エボヤが15個/ト出现しており、3種類とも先週より減少していました。


ザラボヤの出現状況（硬い水ホヤ）




付着物ラーバの出現状況

イガイラーバ	St. 1	St. 4	St. 5	St. 8	平均
140 ~ 150	11	3	14	5	8
150 ~ 160	45	0	21	0	17
160 ~ 170	92	0	21	3	29
170 ~ 180	64	0	14	5	21
180 ~ 190	4	0	0	0	1
190 ~ 200	2	3	7	0	3
200 ~ 210	0	0	2	0	0
210 ~ 220	2	0	0	0	1
220 ~ 230	0	0	2	0	0
230 ~ 240	0	0	0	0	0
240 ~ 250	0	0	0	0	0
250 ~ 260	0	0	0	0	0
260 ~ 270	0	0	0	0	0
270 ~ 280	2	0	0	0	1
280 ~ 290	0	0	0	0	0
290 ~ 300	0	0	0	0	0
合計	223	5	82	14	81
200 μm以上	4 2%	0 0%	4 4%	0 0%	2 2%
260 μm以上	2.1 1.0%	0.0 0.0%	0.0 0.0%	0.0 0.0%	0.5 0.7%
ザラボヤ	2	24	29	50	26
ユウレイボヤ	10	28	45	24	27
エボヤ	10	8	37	5	15

ユウレイボヤの出現状況（水ホヤ・はなたれ）



エボヤの出現状況（いぼホヤ）



付着物ラーバ関連調査地点図

