

◎外海ラーバ調査（湧別漁協青年部による調査）


調査の結果、湧別紋別境界で 17.7 個/トンのホタテガイラーバが確認されました。サイズは 140～160 μm の小型個体为中心でした。260 μm 以上の付着サイズはみられませんでした。

水温は湧別紋別境界底層で 5.9℃で、サンプル海水は植物プランクトンによる濁りが依然として見られました。

佐呂間と常呂の調査は時化のため2日に順延しました。週明けは6日（火）に実施予定です。

外海ラーバの出現状況

	湧別紋別境界	第1湖口沖下側	常呂漁港沖	平均
140 ～ 150	7.1	2		7.1
150 ～ 160	5.3			5.3
160 ～ 170	1.4	日		1.4
170 ～ 180	1.8			1.8
180 ～ 190	0.7	実		0.7
190 ～ 200	0.0			0.0
200 ～ 210	0.0	施		0.0
210 ～ 220	0.7			0.7
220 ～ 230	0.0	予		0.0
230 ～ 240	0.4			0.4
240 ～ 250	0.4	定		0.4
250 ～ 260	0.0			0.0
260 ～ 270	0.0			0.0
270 ～ 280	0.0			0.0
280 ～ 290	0.0			0.0
290 ～ 300	0.0			0.0
合計	17.7			17.7
200 μm 以上	1.4			1.4
	8.0%			8.0%
260 μm 以上	0.0			0.0
	0.0%			0.0%
イガイ	0.7			0.7



外海水温（水深20m地点）

水深	紋別境界	常呂漁港沖
0m	5.61	2日 実施予定
5m	5.93	
10m	5.91	
15m	5.88	
底	5.85	


4/28 オホーツク海沿岸水温(℃)

	枝幸	
水深 (m)	20m地点	25m地点
0	6.6	6.6
5	6.4	6.6
10	6.4	6.5
15	6.5	6.5
20	6.4	6.4
25		6.4


◎湖内ラーバ調査（協力：水産技術普及指導所）

調査の結果、湖内5地点平均で23.2個/トンのホタテガイラーバが確認されました。サイズは140 μm 前後の小型個体为中心で、260 μm 以上の付着サイズは見られませんでした。サンプル海水は植物プランクトンによる濁りが見られました

次回の調査は6日（火）に実施予定です。



サロマ湖ラーバ出現状況



	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	平均
140 ~ 150	1.4	10.1	58.0	9.9	5.7	17.0
150 ~ 160	1.4	4.0	4.2	2.8	2.8	3.1
160 ~ 170	1.4	4.0	2.8	0.0	0.0	1.7
170 ~ 180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180 ~ 190	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.6
190 ~ 200	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.6
200 ~ 210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210 ~ 220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220 ~ 230	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.3
230 ~ 240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
240 ~ 250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
250 ~ 260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
260 ~ 270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
270 ~ 280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
280 ~ 290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
290 ~ 300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	5.7	18.2	70.7	12.7	8.5	23.2
200 μm 以上	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.3
	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	1.2%
260 μm 以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
イガイ	0	6	1	0	0	1